



Liebe Patientin, lieber Patient!

016328/5000 GP DE

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

---

# Acidum succinicum-Injeel®

## Flüssige Verdünnung zur Injektion

---

Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum succinicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a) 0,367 g, Acidum succinicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a) 0,367 g, Acidum succinicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) 0,367 g.

Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Flüssige Verdünnung zur Injektion

10, 100 Ampullen zu 1,1 ml

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden

Telefon: 0 72 21/501-00


Fax: 0 72 21/501-690

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Sollten die Krankheitssymptome bei der Anwendung des Arzneimittels fortbestehen, so ist medizinischer Rat einzuholen.

**-Heel**

---





### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Acidum succinicum-Injeel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Acidum succinicum-Injeel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel von Acidum succinicum-Injeel und wie oft sollten Sie Acidum succinicum-Injeel anwenden?*

Bei akuten Zuständen bis zu 3mal täglich eine Ampulle.

Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren.

Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis.

Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.


### **Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Acidum succinicum-Injeel auftreten?*

Zu diesem Präparat sind keine Nebenwirkungen bekannt.


Sollten Sie jedoch Nebenwirkungen an sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!



### **Farbiger Punkt nach oben!**

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



### **Farbiger Punkt nach oben!**

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.

