

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SANUVIS D1 Salbe

Homöopathisches Arzneimittel · Wirkstoff: Acidum L(+)-lacticum D1

Zusammensetzung:

1 g Salbe enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

0,10 g **Acidum L(+)-lacticum D1** dil. (HAB, Vorschrift 5a, D1 mit gereinigtem Wasser).

Sonstige Bestandteile:

0,38 g Wollwachsalkoholsalbe

0,10 g Mittelkettige Triglyceride

0,03 g Glycerolmonostearat 40–50%

0,23 g Propylenglycol

0,02 g Magnesiumsulfat · 7 H₂O

0,14 g Wasser für Injektionszwecke.

Darreichungsform und Inhalt: 30 g / 300 g (10 x 30 g) Salbe zur Anwendung auf der Haut.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-KEHLBECK

GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

*Was müssen Sie vor der Anwendung von **SANUVIS® D1** Salbe beachten?*

Cetylstearylalkohol (Bestandteil der Wollwachsalkoholsalbe) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann ebenfalls Hautreizungen hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **SANUVIS® D1** anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet: 1–3mal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auftragen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

*Wie lange sollten Sie **SANUVIS® D1** anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf der Tube und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Gebrauchsinformation: 15. 03. 2004.

Hinweis: Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) lagern!

Zur weiteren Anwendung stehen **SANUVIS®** Injektionen, Tabletten und Tropfen zur Verfügung.